



KIV-Ruhrgebiet e. V. Witten – Aktuell 21/09/2016

Wertvolle Tipps zur Bienenpflege von Gerhard Liebig

„Ruhrstadt-Imker Aktuell“ vom 21. September 2016

September 2016: viel Tracht und wenig Milben

In Kürze

- **Das Wetter:** Von Ende August bis Mitte September war es hochsommerlich warm. Die in diesem Zeitraum durchgeführten Ameisensäurebehandlungen sollten gut gewirkt haben.
- **Die Tracht:** Während des sehr warmen Spätsommers hat vor allem das Indische Springkraut gehonigt. An einigen Ständen –aber nicht überall (!)– war die Tracht so gut, dass Alt- und Jungvölker (noch) nicht gefüttert werden müssen.
- **Die Völker:** Da und dort sind ihre Brutnester stark verhonigt. Die Völker haben viel weniger Brut als sonst. Manche sind sogar brutfrei. Diesem „Brutknick“ wird ein „Bienenknick“ folgen. Bei der Einwinterung im Oktober muss unbedingt darauf geachtet werden, ob die Völker stark genug für die Überwinterung sind.
- **Die Milben:** Der Varroabefall der Völker ist (noch) niedrig. Dennoch oder deswegen ist er immer wieder durch Gemülldiagnose zu überwachen. Wer beobachtet weiß Bescheid und ist vor Überraschungen geschützt.

Während der sehr guten Spätsommertracht haben starke Völker so viel Honig eingetragen, dass sie gar nicht gefüttert werden müssen. Alle Völker –auch die schwächeren– haben den Honig brutnestnah eingelagert. Dabei ist ihr Brutnest sehr stark geschrumpft. Bei solchen Völkern lohnt es sich eventuell, eine leere Wabe vom Rand ins Zentrum zu hängen, um das Brutgeschäft wieder (schneller) in Gang zu bringen. Man kann diesen Eingriff auch bleiben lassen und alle Völker –auch die schwachen– vorerst sich selbst überlassen.

Mit dem Rückgang der Temperaturen auf herbstliches Niveau hat der Nektareintrag deutlich nachgelassen, auch wenn das Springkraut nach wie vor befliegen wird. Die Völker werden wieder leichter. Gegen Ende September sollte ihr Futtervorrat überprüft und eventuell ergänzt werden.

Zur Varroasituation

Für die erste Behandlung der Altvölker herrschten Ende August/Anfang September ideale Bedingungen. Auch an den schattigen Standorten waren die mit 100 ml Ameisensäure gefüllten Flaschen nach drei Tagen leer. Der durch diese Behandlung ausgelöste Milbenfall hält etwa zwei Wochen an, weil die Ameisensäure auch in die verdeckelte Brut wirkt und die dort getöteten Milben erst fallen, wenn die Brut schlüpft. Erst nach dem Schlupf dieser Brut stellt sich wieder natürlicher Milbenfall ein. Er sollte erfasst werden, bevor eine weitere Behandlung durchgeführt wird.

Das Gleiche gilt auch für die Jungvölker. Sie werden erst behandelt, wenn ihre Auffütterung abgeschlossen ist. Weil sie nur in einer Zarge sitzen, wird der Dispenser nicht mittig, sondern hinten und am Rand platziert, und zwar so, dass der Docht nicht über Wabengassen mit Brut zu liegen kommt. So kann Brutschäden vorgebeugt werden.

Wer Probleme bei der Varroabehandlung hat kann sich immelielieb@t-online.de wenden.

Hinweise für die Winterauffütterung

Welches Futter?

Für die weitere Volksentwicklung incl. Überwinterung ist es egal, ob die Völker mit Zuckerwasser, Sirup oder Futterteig aufgefüttert werden. Zuckerwasser und Sirup werden schneller abgenommen als Futterteig.

Während der Auffütterung wird Futter verbraucht. Unabhängig davon welches Futter gegeben wird gilt als Faustformel: „1 kg Zucker (Trockensubstanz) ergibt 1 kg Winterfutter in den Waben“.

Der im Handel erhältliche Sirup hat einen Zuckergehalt von 75%. Bei seiner Verfütterung kann man davon ausgehen, dass aus 1 Liter Sirup 1 kg Winterfutter entsteht.

Wann hat ein Volk genug Futter?

Durch Anheben des Volkes (von hinten genügt) kann man beurteilen, wie schwer bzw. ob ein Volk schwer genug ist. So lässt sich auf jeden Fall das leichteste Volk herausfinden.

Die Überprüfung des Gewichtes gelingt auch mit einer Kofferwaage. Man kann die Völker damit von hinten und von vorne wiegen und addiert die beiden Gewichtszahlen. Es genügt aber auch die Wägung von hinten und den so ermittelten Wert zu verdoppeln. Wenn die Völker in einer Einfachbeute (aus Weymouthskiefernholz, 10 Zanderwaben pro Zarge, mit Blechhaube) untergebracht sind, sollten 1-Zargen-Völker nach der Auffütterung etwa 28 kg wiegen und 2-Zargen-Völker 42 kg.

Wem diese Richtwerte nicht genügen und wer ohne Waage auskommen will kann auch den Futtervorrat des leichtesten Volkes mit der „Achtelmethode“ genau erfassen und danach den Vorrat der schwereren Völker beurteilen. Beim Schätzen hat man auch wieder Gelegenheit, Bienen und Königin hautnah zu erleben.

Es klappt nicht immer auf Anhieb!

Futter wird nicht abgenommen!

Dann ist die Entfernung zwischen Bienensitz und Futtergefäß in der aufgesetzten Leerzarge zu groß.

Abhilfe durch „Spur legen“, ohne dass Futterlösung in den Gitterboden tropft. Einen mit Futterlösung (Sirup oder Zuckerwasser) leicht angefeuchteten Lappen über den Rand des Futtergefäßes hängen.

Oder Futtergefäß näher an den Bienensitz bringen, z.B. Futtertasche (2 [!] Waben breit; dicht [!], deshalb aus Kunststoff) an den Rand der von Bienen besetzten Zarge hängen. Zwei Waben müssen weichen. Sie werden während der Fütterung in der aufgesetzten Leerzarge untergebracht.

Damit die neben dem Bienensitz gehängte Futtertasche leichter gefunden wird, ein Ästchen in Sirup tauchen und als Brücke quer über die Rähmchen legen. Mit Folie abdecken und Innendeckel verkehrt herum auflegen.

Bienen dürfen nicht ersaufen!

Deshalb auf das Futter eine **Schwimmhilfe** (eine dichte Schicht von Korken, Kiefernzapfen, passend geschnittene oder gebrochene Zweigstücke oder Pflanzenteile, Gras) geben.

Bei Futtergefäßen mit senkrechten und glatten Innenwänden ist auch eine **Aufstieghilfe** notwendig (ein über eine Wand gehängter Lappen oder in den Behälter eingestelltes passend gebrochenes Zweiggestrüpp).

Fütterung soll keine Räuberei auslösen!

Nach der Futtergabe nimmt der Flugbetrieb zu, sobald das Futter entdeckt wird. Deshalb abends Futter reichen. Fluglöcher von schwachen Völkern klein halten.

Dr. Gerhard Liebig, Bochum, immelielieb@t-online.de

